

## Determinantes

## Álgebra Linear e Geometria Analítica A

## Soluções da Folha Prática 2

1. 1; -3; 1; -43; 3.
2. 28; -7; -280.
3.  $\lambda \in \{-4, -1, 0\}$ .
5. (a)  $|A^T| = 3$ ; (b)  $|AB| = -15$ ; (c)  $|A^4| = 81$ ; (d)  $|B^{-1}| = -\frac{1}{5}$ ;  
(e)  $|2A| = 96$ ; (f)  $|2A^{-1}| = \frac{32}{3}$ ; (g)  $|(2A)^{-1}| = \frac{1}{96}$ ; (h)  $|AB^{-1}A^T| = -\frac{9}{5}$ .
6.  $\frac{16}{3}$ .
7. 96.
9. (a) 3; (b) 5; (c) 16; (d) -2.
10. (a) -13; (b) 37; (c) 1496; (d) -8; (e) 0.
11. (a)  $\begin{bmatrix} -14 & -2 & -11 \\ -32 & 14 & 12 \\ -40 & 50 & 15 \end{bmatrix}$ ; (b) -130; (d)  $\begin{bmatrix} \frac{7}{65} & \frac{1}{65} & \frac{11}{130} \\ \frac{16}{65} & -\frac{7}{65} & -\frac{6}{65} \\ \frac{4}{13} & -\frac{5}{13} & -\frac{3}{26} \end{bmatrix}$ .
12.  $\text{adj } A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ ;  $A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ;  $\det(A) = -2$ .
13.  $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} & -\frac{11}{60} \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ ;  $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{7}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$ ;  $\begin{bmatrix} 3 & -\frac{39}{17} & 2 & -\frac{16}{17} \\ 0 & \frac{2}{17} & 0 & \frac{3}{17} \\ -1 & \frac{21}{17} & -1 & \frac{6}{17} \\ 0 & \frac{5}{17} & 0 & -\frac{1}{17} \end{bmatrix}$ ;  $\begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d} \end{bmatrix}$ .
14. O elemento (1,2) de  $A^{-1}$  é 0.
15. (a) 2; (b) O elemento (2,3) de  $\text{adj } A$  é 2 e o elemento (2,3) de  $A^{-1}$  é 1.
16. O elemento (4,1) de  $A^{-1}$  é -1.
17.  $\alpha \in \{8, -5, -1\}$ .
18.  $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{-2 - \sqrt{10}, 0, -2 + \sqrt{10}\}$ .
19. Se a matriz dos coeficiente do sistema é quadrada e tem determinante não nulo.
20. (a)  $x = -2, y = 1, z = -3$ ;  
(b)  $x = -\frac{28}{11}, y = -\frac{34}{11}, z = -\frac{30}{11}$ ;  
(c)  $x = -2, y = -1, z = -8$ ;  
(d)  $x = 1, y = -1, z = 0, w = 2$ .
21. Se  $\det(A) \neq 0$ , então  $A$  é invertível e  $AB = AC \Rightarrow A^{-1}(AB) = A^{-1}(AC) \Rightarrow (A^{-1}A)B = (A^{-1}A)C \Rightarrow B = C$ .
23. (a) Verdadeira; (b) Falsa; (c) Falsa; (d) Falsa; (e) Verdadeira;  
(f) Falsa; (g) Verdadeira; (h) Verdadeira; (i) Falsa; (j) Falsa.